

KULLANMA TALİMATI

OCULOTECT FLUID %5 steril göz damlası

Göze damlatılarak uygulanır.

Steril

- **Etkin madde:** Her 1 ml çözelti 50 mg polividon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Benzalkonyum klorür, borik asit, sodyum klorür, sodyum laktat, potasyum klorür, kalsiyum klorür, magnezyum klorür, sodyum hidroksit (pH ayarlayıcı), enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

Bu kullanma talimatında:

1. **OCULOTECT FLUID nedir ve ne için kullanılır?**
2. **OCULOTECT FLUID'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **OCULOTECT FLUID nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **OCULOTECT FLUID'in saklanması**

Başlıkları yer almaktadır.

1. OCULOTECT FLUID nedir ve ne için kullanılır?

OCULOTECT FLUID, hemen hemen renksiz, berrak sulu çözelti şeklinde bir göz damlasıdır. Her 1 ml çözelti etkin madde olarak 50 mg polividon içerir.

OCULOTECT FLUID, 10 ml çözelti içeren saydam şişelerde takdim edilmektedir.

OCULOTECT FLUID, oftalmolojikler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

OCULOTECT FLUID, kuru göz hastalığı dahil, göz kuruluğunda (gözyaşı filminin dayanıksız olduğu durumlarda gözyaşı yerine veya göz yüzeyinin nemlenmesinin yetersiz olduğu durumlarda) kullanılır.

2. OCULOTECT FLUID'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

OCULOTECT FLUID'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

- OCULOTECT FLUID'in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa.

OCULOTECT FLUID'i ařađıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eđer:

- Kontakt lens kullanıyorsanız.
- Bař ađrısı, gözde ađrı, görmede deđişiklikler, gözlerde tahriř, kalıcı kızarıklık oluřursa, belirtiler kötüleřirse veya devam ederse tedaviyi kesin ve doktorunuza danıřın.

Bu uyarılar geçmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

OCULOTECT FLUID'in yiyecek ve iecek ile kullanılması:

Kullanım yolu nedeniyle yiyecek ve ieceklerle etkileřimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Doktorunuz gerekli görmedike OCULOTECT FLUID'i hamilelik döneminde kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduđunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.

OCULOTECT FLUID emzirme döneminde kullanılabilir.

Ara ve makine kullanımı

İlacın damlatılmasından hemen sonra görmede bulanıklık yařıyorsanız, ara ya da makine kullanmayınız.

OCULOTECT FLUID'in ieriđinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

OCULOTECT FLUID koruyucu olarak benzalkonyum klorür maddesini ierdiđinden gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuřak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi ıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuřak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduđu bilinmektedir.

Sodyum ieren yardımcı maddeler ile ilgili olarak, dozu ve ürünün kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Potasyum ieren yardımcı maddeler ile ilgili olarak, dozu ve ürünün kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diđer ilalar ile birlikte kullanımı

Eđer:

- OCULOTECT FLUID ile birlikte bařka göz ilaları kullanıyorsanız iki ila uygulaması arasında en az 5 dakika bekleyiniz ve OCULOTECT FLUID'i gözünüze daima en son damlatınız.

Eđer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandıysanız lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

3. OCULOTECT FLUID nasıl kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde gözünüze günde 4 defa 1 damla uygulayınız. Doktorunuzun tavsiyelerine her zaman uyunuz.


Uygulama yolu ve metodu:

Uygulamadan önce ellerinizi yıkayınız.

Solüsyonun kirlenme riski olduğundan, şişenin ucunun herhangi bir yüzeye temasından ve göze hasar verebileceğinden gözle temasından kaçınınız.

Aşağıda belirtildiği şekilde gözünüze uygulayınız:

1. Başınızı arkaya doğru eğiniz; bir elinizle alt göz kapağınızı yavaşça aşağı çekerek gözünüz ile göz kapağınız arasında bir çukur oluşturunuz.
2. Diğer elinizle şişeyi baş aşağı, gözünüzün üstünde dik olarak tutunuz. Yavaşça sıkarak bir damla damlatınız. Kabın ucunu eliniz veya gözünüze değdirmemeye dikkat ediniz.
3. Damlattıktan sonra gözünüzün iç ucuna parmak ucunuz ile 1-2 dakika bastırınız. Bu, ilacın gözyaşı kanallarından buruna akmasını önler.



Değişik yaş grupları:

Çocuklarda kullanımı:

OCULOTECT FLUID'in çocuklarda etkililik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Yaşlılarda kullanımı:

Yaşlılarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

OCULOTECT FLUID'in böbrek veya karaciğer yetmezliğinde etkililik ve güvenliliği çalışılmamıştır.

Eğer OCULOTECT FLUID'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla OCULOTECT FLUID kullandıysanız:

Çözeltinin fazlası gözden dışarıya akacağı için göze kazayla 1 damladan fazla damlatılması genelde bir sorun teşkil etmez.

OCULOTECT FLUID'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

OCULOTECT FLUID'i kullanmayı unutursanız:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

OCULOTECT FLUID ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Bulunmamaktadır.

4. Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, OCULOTECT FLUID'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, OCULOTECT FLUID'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

- Aşırı duyarlılık reaksiyonları

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin OCULOTECT FLUID'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

- Gözde hafif ve geçici yanma ya da yapışkanlık hissi
- Gözde tahriş
- Görmede bulanıklık
- Gözde ağrı
- Gözde kaşıntı
- Gözde tahriş
- Gözde anormal duyarlılık
- Gözde kızarıklık

Bunlar OCULOTECT FLUID'in hafif yan etkileridir.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda, hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

5. OCULOTECT FLUID'in saklanması

OCULOTECT FLUID'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Kullandıktan sonra kapağını hemen kapatınız.

Işıktan korumak için dış ambalajı içerisinde saklayınız.

Şişe açıldıktan sonra 4 hafta içerisinde kullanılmalıdır. Kullanılmayan kısmı saklamayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra OCULOTECT FLUID'i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz OCULOTECT FLUID'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

Ruhsat sahibi: Novartis Sağlık, Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kavacık / Beykoz / İstanbul

Üretim yeri: Excelvision AG
Rue de la Lombardi re,
07100 Annonay/Fransa

Bu kullanma talimatı 20.09.2017 tarihinde onaylanmıřtır.